

Профилактика:

1. проведение истребительных мероприятий в отношении грызунов (дератизация);
2. обеспечение грызунонепроницаемости жилых и производственных помещений;
3. защита пищи и воды от доступа грызунов;
4. соблюдение мер предосторожности во время отдыха или активной деятельности на природе, в т.ч. использование репеллентов, одежды, которая максимально закрывает кожу; периодический осмотр тела и одежды на предмет наличия клещей;
5. использование механических устройств для предупреждения проникновения насекомых в помещения;
6. содержание в должном санитарном состоянии жилых помещений и приусадебных участков;
7. использование средств защиты органов дыхания, глаз, кожи при проведении строительных либо сельскохозяйственных работ, связанных с образованием пыли;
8. соблюдение правил личной гигиены.



**При появлении симптомов не
занимайтесь самолечением,
незамедлительно обратитесь за
медицинской помощью!**

Профилактика
туляремии



Туляремия – острое инфекционное природно-очаговое заболевание, протекающее с интоксикацией, лихорадкой различной интенсивности, поражением кожных покровов, лимфатических узлов, легких, иногда – глаз, кишечника, и характеризующееся склонностью к затяжному течению.

Возбудитель - бактерия франциселла

- устойчив во внешней среде;
- при низких температурах может сохраняться в течение 4-6 месяцев;
- при кипячении погибает моментально;
- при воздействии дезинфицирующих средств – в течение 2-5 минут.

Источниками инфекции являются мелкие грызуны, зайцеобразные, крупный и мелкий рогатый скот, свиньи

От человека к человеку не передается.

Пути передачи:

- 1 Трансмиссивный** – при укусе инфицированными кровососущими насекомыми, клещами
- 2 Контактный** – при контакте с зараженным животным
- 3 Пищевой** – при употреблении обсемененных возбудителем продуктов питания и воды.
- 4 Аэрогенный** – при вдыхании частичек пыли, содержащей возбудителя.

Инкубационный период составляет от 1 дня до 30 дней (в среднем 3-5 дней).

- острое начало болезни с ознобом и повышением температуры сразу до высоких цифр (39-40 °C);
- общая интоксикация с ломотой в теле и болями в суставах;
- головная боль, слабость, нарушение сна, потеря аппетита;
- поражение лимфатических узлов;
- образование на коже язв;
- ангина с некрозом миндалин;
- патологический процесс в кишечнике;
- эрозии и язвы конъюнктивы с гнойным отделяемым;
- развитие легочной формы с поражением бронхов или легких.

признаки туляремии

Симптомы и

